

# Cirsium oleraceum (L.) Scop. - kemijsko i antimikrobno ispitivanje

---

**Tarle, Đurđica; Petričić, Jovan; Kupinić, Mirjana**

*Source / Izvornik:* **Farmaceutski glasnik, 1984, 40, 363 - 367**

**Journal article, Published version**

**Rad u časopisu, Objavljena verzija rada (izdavačev PDF)**

*Permanent link / Trajna poveznica:* <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:163:681273>

*Rights / Prava:* [In copyright](#) / Zaštićeno autorskim pravom.

*Download date / Datum preuzimanja:* **2024-07-12**



*Repository / Repozitorij:*

[Repository of Faculty of Pharmacy and Biochemistry University of Zagreb](#)



DIGITALNI AKADEMSKI ARHIVI I REPOZITORIJ

# FARMACEUTSKI GLASNIK

## GLASILO FARMACEUTSKOG DRUŠTVA HRVATSKE

GOD. XL

NOVEMBAR—DECEMBAR 1984.

BROJ 11-12

FAGLAI

Farm. Glas.

YU ISSN 0011—8202

### NAUČNI RADOVI

Durđica Tarle, Jovan Petričić i Mirjana Kupinić (Zagreb)

#### **Cirsium oleraceum (L.) Scop. — kemijsko i antimikrobnno ispitivanje**

(Primljeno 29. II 1984.)

*Cirsium oleraceum (L.) Scop. — chemical and antimicrobial investigation*

**SUMMARY** — The presence of alkaloids and saponins in the dry perennial plant material of *Cirsium oleraceum (L.) Scop.* was determined. Extract didn't exhibit hemolytic activity, but after exposure to a  $\beta$ -glucosidase the hemolytic activity of the extract increased considerably. From methanolic extract of *Cirsium oleraceum (L.) Scop.* two individual substances C (Rf 0,78) and D (Rf 0,70) are isolated. Substances »C« and »D« exhibit hemolytic activity. Two alkaloid substances »A« and »B« were detected by TL chromatography. Extract of *Cirsium oleraceum (L.) Scop.* inhibited the growth of *Staphylococcus aureus* ATCC 6538, *Escherichia coli* ATCC 10536, and nystatin-sensitive *Candida monospora*.


(Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy and Biochemistry, University of Zagreb and Institute for the Control of Drugs, Zagreb).

### UVOD


*Cirsium oleraceum (L.) Scop.*, osjak ili osat, pripada porodici Asteraceae (Compositae). Biljka se od davnine upotrebljava u liječenju najrazličitijih bolesti, kao npr. proširenih vena, cirkulatornih smetnji, probadanja, upale jetre, krvnog tlaka, gihta, poremećene probave, reumatskih bolesti i dr. Naročito je uočena upotreba biljke kod povrijeđenih i upaljenih dijelova kože, dakle kao jednog protuupalnog sredstva (1). I danas narod često upotrebljava ovu biljku kod povreda i rana tako da ozlijedena mjesta oblaže svježim listovima ili nakanjapava svježim sokom biljke.

*Cirsium oleraceum* (L.) Scop. je trajna biljka koja naraste 50 — 150 cm visoko, Stabljika joj je uspravna, iznutra šuplja, ponekad pri vrhu razgranjena. Listovi nemaju jako izražene i oštре bodljike kao drugi pripadnici roda *Cirsium*. Cvjetne glavice koje stoje na krajevima stabljike ili ogranka, žućkasto su bijele, rjeđe crvenkaste, 2,5 — 4 cm duge, ovijene velikim, bodljikavom nazubljenim eliptičnim listovima (1, 2, 3).


Biljke roda *Cirsium*, prema podacima iz literature (4), sadrže alkaloidne i heterozide cijanogenetskog i flavonskog karaktera. Hegnauer (4) navodi nazočnost alkaloida u plodovima biljke *Cirsium acaule* L., a cijanogenetskih heterozida u vrsti *Cirsium arvense* L. Prema Hegnaueru (4), flavonski heterozidi su derivati triju struktura — apigenina (I), skutelareina (II) i luteolina (III).



I - apigenin



II - skutelarein



III - luteolin

Linarin, derivat apigenina, izoliran je iz listova vrste *Cirsium oleraceum* (L.) Scop. u količini od 0,3%. Pektolinarin, derivat skutelareina, nazočan je u mnogim vrstama roda *Cirsium*, koje su ispitivali japanski istraživači, među njima i *Cirsium oleraceum* (L.) Scop. u količini koja se zavisno od vrste kreće od 0,3% do 2,5%. Još jedan derivat skutelareina, cirsimarin, izoliran je iz vrste *Cirsium maritimum* Makino u količini od 0,2%. Luteolin 7-glukozid, derivat luteolina, izoliran je iz listova vrste *Cirsium matsumurae* Nakai var. *pubescens* Kitamura u količini od 0,06%. Hegnauer (4) navodi nazočnost lignansih supstancija u rodu *Cirsium*, i to poznatog lignana arktina, glukozida arktigenina izoliranog iz sjemena biljke *Arctium lappa* L. = *Lappa major* (5).

Kako biljka *Cirsium oleraceum* (L.) Scop. nije ispitivana u pogledu saponina i antimikrobnog učinka, smatrali smo korisnim ispitati je i s obzirom na nazočnost ovih supstancija i antimikrobnog djelovanje na koje upućuje pučka medicina.

## EKSPERIMENTALNI DIO

### Ispitivanje nazočnosti djelatnih supstancija pomoću TS-kromatografije


#### Nazočnost bazičnih supstancija (alkaloïda)

U ekstraktu pripremljenom po postupku uobičajenom za ekstrakciju alkaloida taloženjem s taninskom kiselinom dobiven je talog, što upućuje na nazočnost alkaloida. Ispitivanje bazičnih supstancija (alkaloïda) u ekstraktu biljke *Cirsium oleraceum* (L.) Scop. provedeno je TS-kromatografijom. Za odjeljivanje supstancija upotrijebljen je sistem otapala metanol-amonijak 10% — voda 14 : 5 : 1 (6), a za detekciju Dragendorffov reagens (7). Dobivene su dvije izrazite tamnonarančaste mrlje na žutoj podlozi, koje odgovaraju supstancijama A i B.

#### Ispitivanje nazočnosti saponina

Nazočnost saponina ispitana je u metanolnom ekstraktu droge, koji je priređen perkolacijom po Ph. Jug. III. Ekstrakt je nanošen na ploču sa silikagelom G prema Stahlu, te odjeljivan sistemom otapala kloroform-metanol-voda 6,5 : 3,5 : 1,0 (8). Za identifikaciju supstancija upotrijebljena je klorsulfonska kiselina: Ekstrakt je pokazao (slika 1) nekoliko mrlja koje odgovaraju supstancijama onačenim od A do J.

Sl. 1 Kromatografija metanolnog ekstrakta droge *Cirsium oleraceum* (L.) Scop.



Sistem otapala: kloroform-metanol-voda 6,5 : 3,5 : 1,0

Reagens za detekciju: klorsulfonska kiselina

Četiri mrlje su posebno izražene (supstancije C, D, G i I), tamnocrvene do crvenosmeđe boje, za koje prepostavljamo na temelju obojenja s klorsulfonskom kiselinom da odgovaraju saponinima. Nazočnost saponina u ispitivanom ekstraktu droge utvrđena je hemolizom, ali nakon prethodnog tretiranja ekstrakta pomoću enzimskog sistema s  $\beta$ -glukozidazom.

### Izolacija saponina

Metanolni ekstrakt biljke *Cirsium oleraceum* (L.) Scop. podvrgnut je obradi enzimskim sistemom s  $\beta$ -glukozidazom tijekom 24 sata na temperaturi od 30°C. Hidrolizat je potom izmućkan s acetonom, filtriran i uparen, te ispitana na tankom sloju u pogledu saponina. Dobivene su četiri supstancije A, B, C i D, koje odgovaraju nepolarnijem dijelu ekstrakta ispitivane droge (slika 1).

Ekstrakt tretiran enzimskim sistemom s  $\beta$ -glukozidazom odjeljivan je na stupcu SiO<sub>2</sub>. Odjeljivanje na stupcu SiO<sub>2</sub> provedeno je sistemom otapala kloroform-metanol-voda 6,5 : 3,5 : 1,0 (8). Odjeljivanjem na stupcu SiO<sub>2</sub> izolirana je smjesa dviju supstancija (C i D) saponinskog karaktera. Iz saponinske smjese preparativnom kromatografijom na tankom sloju izolirane su kromatografski jedinstvene supstancije C i D. Izolirane supstancije C i D pokazuju hemolitičku aktivnost.

### Ispitivanje antimikrobične aktivnosti ekstrakta droge

Ekstrakt biljke *Cirsium oleraceum* (L.) Scop. podvrgnut je ispitivanju antimikrobnog učinka. Ispitivanje je obavljeno mikrobiološkom metodom difuzije na krutoj hranjivoj podlozi (9). Zone inhibicije očitane su nakon inkubacije na 35°C tijekom 17 sati.

### REZULTATI I DISKUSIJA

Za ispitivanje je upotrebljavan osušen nadzemni dio biljke *Cirsium oleraceum* (L.) Scop. sakupljen u Zagrebu (Rudeš) u svibnju 1981. godine.

U ekstraktu ispitivanog uzorka taloženjem s taninskom kiselinom, a potom kromatografijom na tankom sloju dokazana je nazočnost dviju A (Rf = 0,82) i B (Rf = 0,46) bazičnih (alkaloidnih) supstancija.

Iz metanolnog ekstrakta ove droge tretiranog enzimskim sistemom s  $\beta$ -glukozidazom, a potom odvajanog preko stupca SiO<sub>2</sub> izolirana je smjesa dviju supstancija C i D, koja pokazuje hemolitičku aktivnost. Iz saponinske smjese preparativnom kromatografijom na tankom sloju izolirane su dvije supstancije C (Rf = 0,78) i D (Rf = 0,70), koje djeluju hemolitički. Ekstrakt biljke *Cirsium oleraceum* (L.) Scop. koji nije obrađen fermentnim sistemom s  $\beta$ -glukozidazom ne pokazuje hemolitičku aktivnost. Isti ekstrakt podvrgnut djelovanju fermentnog sistema s  $\beta$ -glukozidazom pokazuje izrazitu hemolitičku aktivnost. Ova pojava ukazuje na analogiju s nekim drugim saponinima, npr. sa sarsaparilozidom, bisdezmoidnim 22-hidroksi-furostanol saponinom izoliranim iz *Radix Sarsaparillae* (10), koji tek nakon obrade enzimskim sistemom s  $\beta$ -glukozidazom pokazuje hemolitičku aktivnost. Sarsaparilozid ima na C-3 steroidne strukture jedan šećerni lanac, a na C-26 glukozu, dakle drugi šećerni lanac.  $\beta$ -glukozidaza lako

otcjepljuje glukozu na C-26 te nastaje monodesmozidni saponin. Utvrđeno je da se otcjepljenjem glukoze na C-26 hemoliza bitno pojačava. Pretpostavljamo da se slična pojava dešava kod saponina nadzemnih dijelova biljke *Cirsium oleraceum* (L.) Scop.

Ukupni ekstrakt droge podvrgnut je ispitivanju antimikrobne aktivnosti. Ekstrakt pokazuje antimikrobički učinak na mikroorganizmima *Staphylococcus aureus* ATCC 6538, *Escherichia coli* ATCC 10536 i *Candida monosa*, koja je osjetljiva na nistatin.

S obzirom na obavljena ispitivanja može se zaključiti da biljka *Cirsium oleraceum* (L.) Scop, uz flavonoidne, alkaloidne sadržave i saponinske supstance. Ekstrakt pokazuje antimikrobičku aktivnost, i to na mikroorganizmima koji uzrokuju kožne afekcije, oboljenja sluznica, lokalna oboljenja raznih tkiva i organa te ljetne, odnosno epidemische dijareje. Ova činjenica opravdava upotrebu ove droge u liječenju u pučkoj medicini. Daljnja istraživanja pokazuće u kojoj će se mjeri ova biljka moći primjenjivati u znanstvenoj medicini.

(Zavod za farmakognosiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb i Zavod za ispitivanje i kontrolu lijekova SRH, Zagreb).

#### Literatura — References

- (1) L. Kroeber: Das Neuzeitliche Kräuterbuch, Band II, Hippokrates-Verlag G. M. B. H. Stuttgart—Leipzig, 1935, 97.
- (2) Lj. Grlić: Samoniklo jestivo bilje, Prosvjeta, Zagreb, 1980, 282.
- (3) G. Hegi: Illustrierte Flora von Mittel-Europa, Carl Hanser (Verlag), München, Band VI, 2. Teil, 1954, 898.
- (4) R. Hegnauer: Chemotaxonomie der Pflanzen, Band III, Birkhäuser Verlag, Basel und Stuttgart, 1964, 502—526, 659.
- (5) W. Karrer: Konstitution und Vorkommen der organischen Pflanzenstoffe, Birkhäuser Verlag, Basel—Stuttgart, 1958, 468.
- (6) E. Stahl: Dünnenschicht-Chromatographie, (Ein Laboratoriumshandbuch), Springer-Verlag, Berlin—Heidelberg—New York, 1967, 405.
- (7) Dyeing Reagents for Thin Layer and Paper Chromatography, E. Merck, Darmstadt, Germany, 1976.
- (8) T. Kawasaki i K. Miyahara: Chem. Pharm. Bull. (Tokyo) 11, 1546 (1963).
- (9) R. S. Varma i W. L. Nobles, J. Pharm. Sci. 61, 112 (1972).
- (10) R. Tschesche, G. Lüdke i G. Wulff, Tetrahedron Letters 29, 2785 (1967).